

COMMENT INJECTER BESREMI^{MD}

GUIDE D'UTILISATION

BESREMI^{MD}
(ropeginterféron alfa-2b),
pour injection sous-cutanée uniquement

Seringue préremplie unidose

Lire attentivement les Renseignements importants sur l'innocuité (sécurité). On y explique les risques graves de BESREMI^{MD} et comment utiliser le médicament de façon sécuritaire. Communiquer avec votre professionnel de la santé si vous avez des questions.

Quelles sont les informations les plus importantes que je dois connaître à propos de BESREMI^{MD}?

Les interférons, y compris BESREMI^{MD}, peuvent entraîner ou aggraver certains troubles mortels ou mettant la vie en danger, notamment les troubles neuropsychiatriques (maladies mentales), auto-immuns (quand le système immunitaire de l'organisme attaque ses propres cellules), ischémiques (quand la circulation du sang et, par conséquent, l'apport d'oxygène, sont insuffisants dans une partie du corps) et infectieux. Si vous présentez des signes ou des symptômes graves et persistants de ces affections, ou que ceux-ci s'aggravent, vous devez communiquer avec votre médecin. Il vous examinera et pourra arrêter votre traitement. Dans de nombreux cas, mais pas toujours, ces troubles disparaissent après l'arrêt du traitement par l'interféron.

Ce livret est destiné aux patients à qui l'on a prescrit BESREMI^{MD} et doit être utilisé en complément des conseils fournis par votre professionnel de la santé.

Ce guide d'utilisation est un résumé et n'inclut pas tous les renseignements à propos de BESREMI^{MD}. Pour des Renseignements complets sur l'innocuité, notamment sur les mises en garde et précautions importantes, les contre-indications, les effets indésirables, les considérations posologiques et les exigences de surveillance avec BESREMI^{MD}, veuillez lire les pages 11 à 13 de ce livret et consulter également le feuillet de Renseignements destinés aux patient-e-s joint à l'emballage de BESREMI^{MD}. Si vous avez des questions sur BESREMI^{MD} et sur l'injection du médicament, parlez-en avec votre professionnel de la santé.

Table des matières

Votre professionnel de la santé vous a prescrit BESREMI^{MD}, un médicament injectable destiné à traiter les adultes atteints de la polycythémie vraie (PV). Ce guide vous explique tout ce que vous devez savoir sur la préparation et l'injection de BESREMI^{MD}.

Page 2	Informations importantes à connaître avant l'injection de BESREMI ^{MD} en seringue préremplie unidose
Page 3	Guide des composants de la seringue et entreposage
Page 4	Rassembler et vérifier le matériel
Page 6	Préparer la seringue pour l'injection
Page 9	Injecter BESREMI ^{MD}
Page 10.....	Éliminer la seringue et l'aiguille usagées
Page 11	Renseignements importants sur l'innocuité

Regardez la vidéo explicative pour l'injection de BESREMI^{MD}

Balayez le code QR ou visitez le site www.besremi.ca pour en savoir plus et regarder la vidéo qui montre, étape par étape, comment préparer et injecter BESREMI^{MD}.



Vous avez encore des questions sur l'utilisation de BESREMI^{MD}?

- Rendez-vous au www.besremi.ca pour consulter les réponses de la Foire aux questions.
- Parlez à une infirmière-gestionnaire de cas du Programme de soutien aux patients ForYOU^{MC} en appelant au 1-833-4YOUPSP (1-833-496-8777) entre 9 h et 17 h du lundi au vendredi ou en écrivant un courriel à besremi@foryoupsp.com.


Informations importantes à connaître avant l'injection de BESREMI^{MD} en seringue préremplie unidose.

Veillez lire ce guide d'utilisation (mode d'emploi) avant d'utiliser votre seringue préremplie unidose de BESREMI^{MD} et à chaque fois que vous obtenez une nouvelle ordonnance. Il peut contenir de nouvelles informations. Ce guide ne remplace pas un entretien avec votre professionnel de la santé au sujet de votre état de santé ou de votre traitement. Demandez à votre professionnel de la santé comment bien préparer et administrer BESREMI^{MD} en solution injectable.

- Votre professionnel de la santé vous indiquera la dose prescrite que vous devez prendre et la quantité adéquate de BESREMI^{MD} à mesurer dans la seringue préremplie pour obtenir cette dose. À chaque injection, assurez-vous que vous connaissez la dose prescrite de BESREMI^{MD} à injecter. Votre dose peut changer au cours du temps.
- BESREMI^{MD} est uniquement destiné à une injection sous-cutanée (c'est-à-dire sous la peau). Ne pas injecter dans une veine.
- BESREMI^{MD} doit être injecté immédiatement après la préparation de la dose.
- BESREMI^{MD} est pour un usage unique. Ne réutilisez pas la seringue préremplie ou l'aiguille.
- Ne pas utiliser une seringue préremplie ou une aiguille endommagée ou cassée. Contactez votre professionnel de la santé pour obtenir une seringue préremplie de remplacement ou des aiguilles supplémentaires.
- Injectez BESREMI^{MD} dans le haut de la cuisse ou le bas du ventre, juste sous la peau. Ne pas injecter BESREMI^{MD} dans une autre zone du corps.
- Jetez (éliminez) immédiatement la seringue usagée de BESREMI^{MD} avec l'aiguille encore attachée.



Guide des composants de la seringue et entreposage

Guide des composants de la seringue préremplie et de l'aiguille



Entreposage de BESREMI^{MD}

- Conservez BESREMI^{MD} au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C, dans sa boîte d'origine, à l'abri de la lumière.
- **Ne pas** congeler les seringues préremplies.
- **Ne pas** utiliser une seringue préremplie qui a été congelée ou exposée à la lumière directe du soleil.
- Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.



Conservez la boîte de BESREMI^{MD} au réfrigérateur


Veuillez consulter les renseignements importants sur l'innocuité figurant aux pages 11 à 13 de ce livret et discuter avec votre professionnel de la santé si vous avez des questions à propos de la PV ou de votre traitement par BESREMI^{MD}.

Rassembler et vérifier le matériel

Étape 1


Préparer la seringue préremplie de BESREMI^{MD}

- 1.1 Sortez la boîte de BESREMI^{MD} du réfrigérateur.




- 1.2 Vérifiez la date de péremption («EXP») sur le dessus de la boîte pour vous assurer qu'elle n'est pas dépassée.

Ne pas utiliser la seringue préremplie au-delà de la date de péremption.



- 1.3 Laissez BESREMI^{MD} reposer sur une surface de travail propre pendant **15 à 30 minutes** pour qu'il parvienne à la température ambiante.

Ne pas réchauffer la seringue préremplie d'une autre manière.




Étape 2

Rassembler le matériel en vue de l'injection

- 2.1 Après avoir laissé la boîte revenir à température ambiante pendant 15 à 30 minutes, rassemblez le matériel supplémentaire suivant.

- A. Un tampon d'alcool
- B. Un contenant pour objets tranchants
- C. Une serviette en papier, un évier ou une poubelle pour minimiser les projections lors de l'ajustement de la dose
- D. Matériel facultatif : un morceau de gaze ou un tampon d'ouate et un petit bandage adhésif



Veuillez consulter les renseignements importants sur l'innocuité figurant aux pages 11 à 13 de ce livret et discuter avec votre professionnel de la santé si vous avez des questions à propos de la PV ou de votre traitement par BESREMI^{MD}.

Rassembler le matériel en vue de l'injection (suite)


Étape 3

Se laver les mains et retirer la seringue de son plateau


- 3.1** Lavez-vous les mains à l'eau et au savon, puis laissez-les sécher à l'air libre.



- 3.2** Ouvrez la boîte et sortez le plateau en plastique transparent qui contient la seringue préremplie de BESREMI^{MD} et l'aiguille emballée.



- 3.3** Retirez l'aiguille emballée et la seringue préremplie de BESREMI^{MD} du plateau en plastique. Tenez la seringue préremplie par le milieu du corps au moment de la sortir.



Étape 4


Vérifier la quantité de médicament liquide dans la seringue préremplie de BESREMI^{MD}

- 4.1** Vérifiez la quantité de médicament liquide dans la seringue préremplie de BESREMI^{MD}. Le liquide doit être limpide, incolore ou légèrement jaunâtre et exempt de particules.

Ne pas utiliser la seringue préremplie si le liquide est trouble, décoloré ou contient des particules. Contactez votre professionnel de la santé ou votre pharmacien.

- 4.2** Vérifiez que la seringue n'est pas endommagée ni cassée.

Ne pas utiliser la seringue préremplie si elle présente des signes de détérioration ou si elle semble cassée. Contactez votre professionnel de la santé ou votre pharmacien.




Préparer la seringue pour l'injection

Étape 5

Fixer l'aiguille à la seringue préremplie de BESREMI^{MD}

5.1 Ouvrez soigneusement l'emballage de l'aiguille, retirez l'aiguille et mettez-la de côté.

Jetez l'emballage dans la poubelle à ordures ménagères.




5.2 Tenez la seringue préremplie comme indiqué.

Retirez le capuchon de la seringue préremplie en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Jetez le capuchon de la seringue dans la poubelle à ordures ménagères.

Ne pas laisser l'embout de la seringue préremplie toucher quoi que ce soit.



5.3 Fixez l'aiguille à la seringue préremplie en la poussant fermement sur le col de la seringue et en la vissant (dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce qu'elle tienne bien fermement.

L'aiguille devrait maintenant être fixée à la seringue préremplie.



Étape 6

Choisir et nettoyer le point d'injection


6.1 Choisissez l'un des points d'injection suivants :

- Bas-ventre (abdomen), à plus de 5 cm (2 pouces) de distance du nombril, ou
- Haut de l'une des cuisses.

Ne pas injecter dans une zone où la peau est irritée, rouge, infectée ou présente des ecchymoses ou des cicatrices.

Ne pas injecter dans une veine. BESREMI^{MD} est uniquement destiné à une injection sous-cutanée (c'est-à-dire sous la peau).

Alternez (changez) le point d'injection lors de chaque injection.



6.2 Nettoyez le point d'injection choisi avec un tampon d'alcool et laissez-le sécher à l'air libre.

Ne pas souffler sur le point d'injection ni le toucher après qu'il a été nettoyé.



Préparer la seringue pour l'injection (suite)


**Lire
ceci**

Comment ajuster le niveau de médicament pour obtenir la dose prescrite


Lors du réglage de la dose à l'étape 8, vous devez aligner le bord extérieur supérieur du bouchon gris avec la ligne de dosage et le numéro figurant sur la seringue et correspondant exactement à la dose qui vous a été prescrite.

N'alignez pas le dôme (au sommet du bouchon) avec la ligne de dosage.

Alignez le bord supérieur extérieur du bouchon avec la ligne de dosage



Exemple d'une dose de 350 mcg



Exemple d'une dose de 350 mcg


Préparer la seringue pour l'injection (suite)

Étape 7

Enlever le capuchon de l'aiguille et déplacer les bulles d'air vers le haut

7.1 Tirez la protection rose de l'aiguille vers l'arrière.

Remarque : la protection rose de l'aiguille sera utilisée après l'injection pour couvrir l'aiguille et prévenir les éventuelles blessures.




7.2 Tenez la seringue par le corps.

Retirez le capuchon transparent de l'aiguille en le tirant vers le haut.

Jetez le capuchon de l'aiguille dans la poubelle à ordures ménagères.


Ne pas recapuchonner l'aiguille.

Truc : lorsque vous retirez le capuchon, tirez-le d'un seul geste fluide et tenez vos doigts à l'écart de l'aiguille afin d'éviter toute piqûre accidentelle.



7.3 Tenez la seringue préremplie avec l'aiguille dirigée vers le haut.

Tapotez sur le corps de la seringue préremplie pour faire remonter les bulles d'air.



Étape 8


Régler votre dose

8.1 Vérifiez votre ordonnance pour connaître votre dose prescrite. En fonction de la dose qui vous a été prescrite, vous devrez peut-être ajuster la dose contenue dans la seringue en éliminant (en jetant) une partie du médicament de la seringue préremplie avant l'injection.



8.2 Pour régler votre dose, suivez les 4 étapes ci-dessous :

- 1. Tenez** la seringue préremplie à hauteur des yeux, l'aiguille **pointant tout droit vers le haut**, au-dessus d'une serviette en papier, d'un évier ou d'une poubelle.
- 2. Assurez-vous** de voir les lignes de dosage et les marques numériques sur la seringue préremplie.
- 3. Pincez** l'extrémité du piston comme indiqué.
- 4. Poussez lentement le piston vers le haut** pour faire sortir le médicament liquide jusqu'à ce que le bord supérieur du bouchon gris soit aligné avec l'inscription correspondant à **votre dose prescrite. Maintenez la seringue en position verticale pendant que vous réglez la dose.**



Important : en cas de retrait accidentel d'une trop grande quantité de médicament liquide, **ne pas** réaliser l'injection. Contactez votre professionnel de la santé ou votre pharmacien.


Attention : l'exemple présenté dans cette figure peut ne pas correspondre à la dose qui vous a été prescrite. Ajustez toujours le niveau de médicament dans la seringue pour qu'il corresponde à la dose prescrite.

Injecter le BESREMI^{MD}

Étape 9


Effectuer l'injection

9.1 Pincez la peau au point d'injection choisi.




9.2 Tout en pinçant la peau, insérez-y l'aiguille à un angle de 45 à 90 degrés. Relâchez alors la peau.

Truc : lorsque vous insérez l'aiguille, tenez la seringue par le corps et gardez vos doigts éloignés du piston. Cela permet d'éviter que le médicament ne soit libéré avant que vous ne soyez prêt à effectuer l'injection.




9.3 Injectez le médicament en appuyant lentement sur le piston jusqu'à sa butée.

Truc : vérifiez que le piston est bien enfoncé jusqu'au bout afin de garantir l'administration de la dose complète.



9.4 Une fois le médicament liquide injecté, retirez l'aiguille de la peau.




Éliminer la seringue utilisée

Étape 10

Couvrir l'aiguille, jeter (éliminer) la seringue et traiter le point d'injection


10.1 Poussez délicatement la protection rose sur l'aiguille, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et recouvre l'aiguille. Cela permet de prévenir les blessures par piqûre d'aiguille.

Ne pas recapuchonner l'aiguille à l'aide de son capuchon; utiliser uniquement la protection rose pour recouvrir l'aiguille.



10.2 Jeter immédiatement la seringue préremplie usagée, avec l'aiguille encore attachée, dans un contenant d'élimination des objets tranchants.


Remarque : il se peut que votre contenant pour objets tranchants ait un aspect différent ou une couleur différente de celui présenté sur l'image.



10.3 Si une petite quantité de sang ou de liquide est présente au point d'injection, appuyez un morceau de gaze ou un tampon d'ouate sur le point d'injection jusqu'à ce que le saignement s'arrête.

Ne pas frotter le point d'injection.

Au besoin, un petit pansement adhésif peut être appliqué.



Renseignements importants sur l'innocuité

N'utilisez pas BESREMI^{MD} dans les cas suivants :

- Si vous avez une allergie au ropeginterféron alfa-2b ou à tout autre ingrédient de ce médicament.
- Si vous souffrez ou avez souffert de troubles mentaux graves (tels que dépression, pensées suicidaires ou tentative de suicide).
- Si vous avez souffert ou avez souffert d'une maladie auto-immune (telles qu'arthrite rhumatoïde, psoriasis ou maladie inflammatoire de l'intestin).
- Si vous avez reçu une greffe d'organe et prenez des médicaments qui affaiblissent le système immunitaire.
- Si vous avez une maladie du foie avancée et non contrôlée.
- Si vous souffrez d'une maladie rénale sévère.

Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser BESREMI^{MD}, afin d'assurer l'utilisation adéquate du médicament et d'aider à éviter les effets secondaires. Informez votre professionnel de la santé de votre état actuel et de vos problèmes de santé, notamment si :

- vous avez ou avez déjà eu des problèmes avec votre cœur, comme une crise cardiaque ou de l'hypertension artérielle
- vous êtes traités ou avez déjà reçu un traitement pour un problème de santé mentale, y compris la dépression ou avez déjà eu des pensées visant à vous faire mal ou faire mal à autrui
- vous avez une maladie de la thyroïde
- vous avez le diabète ou de l'hypertension artérielle. Votre médecin pourrait vous demander de passer un examen de la vue
- vous avez des problèmes de foie. Vous devrez subir régulièrement des analyses sanguines afin de vérifier le fonctionnement de votre foie si vous suivez un traitement à long terme par BESREMI^{MD}
- vous souffrez ou avez souffert de problèmes du pancréas comme d'une inflammation du pancréas
- vous avez des problèmes de rein
- vous avez des antécédents de troubles intestinaux tels que la colite (inflammation du côlon)
- vous souffrez de problèmes pulmonaires (ou respiratoires), tels que pneumonie, souffle court et maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
- vous avez des problèmes de vision en raison de maladies comme le diabète ou l'hypertension
- vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir
- vous avez du psoriasis ou d'autres problèmes de peau, car ceux-ci pourraient s'aggraver pendant le traitement par BESREMI^{MD}

Autres mises en garde à connaître :

- Les médicaments à base d'interféron peuvent entraîner des troubles au niveau des dents et des gencives susceptibles de causer la perte des dents. De plus, la sécheresse buccale pourrait endommager les dents et la muqueuse de la bouche lors d'un traitement à long terme par BESREMI^{MD}. Vous devez vous brosser soigneusement les dents deux fois par jour et consulter régulièrement votre dentiste.
- Atteindre la dose optimale de BESREMI^{MD} peut prendre du temps et varier d'une personne à l'autre. Votre médecin déterminera s'il est nécessaire de vous prescrire un autre médicament afin de réduire rapidement le nombre de vos cellules sanguines, dans le but de prévenir la formation de caillots sanguins et les saignements.
- Donnez-vous un peu de temps après avoir pris BESREMI^{MD} pour comprendre comment vous vous sentez, avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines.

Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y les médicaments, les vitamines et minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine parallèle.

Renseignements importants sur l'innocuité (suite)

Dose habituelle :

La dose initiale habituelle de BESREMI^{MD} est de 50 ou 100 mcg toutes les 2 semaines. Ce dosage dépend du fait que vous preniez déjà, ou non, d'autres médicaments pour traiter votre maladie. Votre médecin augmentera ensuite votre dose de façon progressive et pourrait l'ajuster en cours de traitement. Votre dose sera augmentée graduellement jusqu'à ce que votre maladie soit maîtrisée ou jusqu'à ce que vous atteigniez la dose maximale.

Surdose :

Si vous avez pris plus de BESREMI^{MD} que vous n'auriez dû, informez votre médecin dès que possible.

Si vous pensez qu'une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez pris une trop grande quantité de BESREMI^{MD}, contactez immédiatement votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital, votre centre antipoison régional ou le numéro sans frais de Santé Canada, 1-844 POISON-X (1-844-764-7669), même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

Vous devez vous injecter la dose dès que vous vous en souvenez. Cependant, si plus de 2 jours se sont écoulés depuis l'oubli, sautez la dose oubliée et injectez la dose suivante au moment prévu. N'injectez pas de double dose pour compenser une dose oubliée. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous n'êtes pas certain de la conduite à adopter en cas d'oubli d'une dose.

Effets secondaires possibles de l'utilisation de BESREMI^{MD}

Voici certains des effets secondaires que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez BESREMI^{MD}. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez avec votre professionnel de la santé.

- diminution du nombre de certains types de globules blancs (appelés leucocytes et neutrophiles), pouvant accroître le risque d'infection, provoquer de la fièvre, des frissons ou une fatigue inhabituelle, ainsi qu'une diminution du nombre de cellules qui aident le sang à coaguler (appelées plaquettes), pouvant entraîner des saignements si leur nombre baisse trop
- anxiété, changements d'humeur
- écoulement nasal, éternuements, toux, fièvre
- douleurs articulaires ou musculaires, douleurs au dos, douleurs osseuses
- augmentation ou diminution de l'activité de la glande thyroïde, augmentation de l'hormone thyroïdienne (TSH), pouvant entraîner de la fatigue, une prise ou une perte de poids, une accélération du rythme cardiaque, une intolérance au froid et une sécheresse de la peau
- fatigue, faiblesse, sensation de grande somnolence
- yeux secs
- maux de tête
- perte d'appétit
- bouche sèche, constipation
- diarrhée, douleur abdominale
- augmentation de certaines enzymes du foie dans les analyses de sang
- démangeaisons, chute de cheveux, rougeurs cutanées, transpiration excessive, peau sèche

Effets secondaires graves et quand en aviser votre médecin

Parlez à votre médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants :

- Fréquents :
 - Anxiété : irritabilité, nervosité, sentiment de panique
 - Fibrillation auriculaire (battements cardiaques très rapides et irréguliers) : inconfort thoracique avec perception désagréable des battements cardiaques, fatigue, faiblesse, étourdissements, essoufflement, sensation de perdre connaissance
 - Cataracte (opacification du cristallin) : vision floue, vision double, sensibilité à la lumière ou à l'éblouissement
 - Hypertension (pression artérielle élevée) : bourdonnements dans les oreilles, maux de tête, vision floue
 - Syndrome pseudo-grippal (symptômes semblables à ceux de la grippe), seulement si sévère : maux de tête, douleurs musculaires, frissons ou fièvre
 - Pancréatite (douleur intense et persistante au niveau de l'estomac, pouvant être le signe d'une inflammation du pancréas)
 - Infection des voies urinaires (incluant les reins, les uretères, la vessie et l'urètre) : mictions fréquentes, douleur ou sensation de brûlure en urinant, sang dans l'urine, douleurs dans le bassin, urine malodorante, urine trouble
- Peu fréquents :
 - Problèmes hépatiques : jaunissement de la peau ou des yeux, urine foncée, douleur abdominale, nausées, vomissements, perte d'appétit, démangeaisons
- Fréquence inconnue :
 - Troubles endocriniens : diabète, soit accrue, mictions fréquentes, perte de poids inexpliquée, vision trouble, fatigue
 - Problèmes respiratoires : essoufflement, fatigue, étourdissements, douleur thoracique, enflure des chevilles ou des jambes

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- En consultant la page Web sur la déclaration des effets indésirables (Canada.ca/medicament-instrument-declaration) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courriel ou par télécopieur; ou
- En téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

Remarque : consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

À quoi sert BESREMI^{MD}?

BESREMI^{MD} est utilisé pour traiter les adultes atteints de polycythémie vraie, un trouble du sang.

Mises en garde et précautions importantes

Les interférons, y compris BESREMI^{MD}, peuvent entraîner ou aggraver certains troubles mortels ou mettant la vie en danger, notamment les troubles neuropsychiatriques (maladies mentales), auto-immuns (quand le système immunitaire de l'organisme attaque ses propres cellules), ischémiques (quand la circulation du sang et, par conséquent, l'apport d'oxygène, sont insuffisants dans une partie du corps) et infectieux. Si vous présentez des signes ou des symptômes graves et persistants de ces affections, ou que ceux-ci s'aggravent, vous devez communiquer avec votre médecin. Il vous examinera et pourra arrêter votre traitement. Dans de nombreux cas, mais pas toujours, ces troubles disparaissent après l'arrêt du traitement par l'interféron.

N'utilisez pas BESREMI^{MD} dans les cas suivants :

Si vous avez une allergie au ropeginterféron alfa-2b ou à tout autre ingrédient de la formulation de BESREMI^{MD} ou du contenant. Si vous souffrez ou avez souffert de troubles mentaux graves, en particulier de dépression grave, de pensées suicidaires ou de tentative de suicide. Si vous avez une maladie du foie avancée et non contrôlée. Si vous avez des antécédents ou la présence d'une maladie auto-immune active grave ou non traitée. Si vous avez reçu une greffe d'organe et prenez des médicaments qui affaiblissent le système immunitaire. Si vous avez une maladie thyroïdienne, sauf si elle peut être contrôlée par un traitement. Si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou vasculaire grave, telle qu'une hypertension non contrôlée, une insuffisance cardiaque congestive, un trouble grave du rythme cardiaque, un rétrécissement important des vaisseaux coronaires, une angine instable, ou si vous avez récemment subi un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque. Si vous souffrez d'une maladie rénale sévère ou terminale.

Cette liste énumère certains des effets secondaires que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez BESREMI^{MD}. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez avec votre professionnel de la santé. En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'un effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez à votre professionnel de la santé.

Comment utiliser BESREMI^{MD}

Prenez BESREMI^{MD} en suivant exactement les indications de votre professionnel de la santé. Il vous indiquera la quantité de BESREMI^{MD} à injecter et le moment de l'injection. N'injectez pas plus que la dose prescrite. Votre professionnel de la santé vous fera passer des analyses de sang avant le début du traitement par BESREMI^{MD} et régulièrement durant le traitement pour surveiller l'évolution de votre polycythémie vraie et l'apparition d'effets secondaires.

Pour plus d'informations

Le présent livret ne remplace pas une discussion avec votre professionnel de la santé. Pour obtenir des informations complètes sur BESREMI^{MD}, notamment sur les mises en garde et précautions importantes, les personnes qui ne doivent pas utiliser BESREMI^{MD}, les effets indésirables possibles, la posologie, la surveillance et le mode d'emploi de BESREMI^{MD}, veuillez lire le feuillet des Renseignements destinés aux patient·e·s joint à l'emballage de BESREMI^{MD} et parlez à votre professionnel de la santé. Vous pouvez aussi consulter le site www.besremirp.ca ou téléphoner FORUS Therapeutics Inc. au 1-866-542-7500.